

COVID-19

பதட்டமடைவதால் தடுக்க முடியாது, மதிநுட்பமாக கையாளப்பட வேண்டும்

COVID - 19 எவ்வாறு பரவுகின்றது

COVID-19 தொற்றுடைய நபர் ஒருவர் இருமினால் அல்லது தொற்றுடைய திரவத்தை உடலிலிருந்து வெளியிட்டால் அதன் மூலமாக ஏனையவர்களுக்கு பரவுகின்றது. பெருமளவான சந்தர்ப்பங்களில் அவை அருகிலுள்ள மேற்பரப்புகள் மற்றும் பொருட்களின் மீது விழுவதால், அதனை தொட்டு, தமது கண்கள், மூக்கு அல்லது வாயை தொடுவதன் மூலமாக பரவுகின்றது. COVID-19 தொற்றுடைய நபரிலிருந்து ஒரு மீற்றர் தூரத்தில் நபர் ஒருவர் காணப்பட்டால், சுவாசத்தினால் திரவத்தை உள்ளெடுப்பதனால் தொற்றக்கூடும்.

- உங்கள் பணியிடம் தூய்மையாகவும் துப்புரவாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்யவும். மேற்பரப்புகள் மற்றும் பொருட்கள் தொற்றுநீக்கி கொண்டு அடிக்கடி கழுவ வேண்டும்.
- ஒவ்வொரு 1 மணிநேரத்துக்கு ஒரு தடவை சவர்க்கார நீர் கொண்டு ஆகக்குறைந்தது 20 செக்கன்கள் வரை கைகளை நன்கு கழுவிக் கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக கழிவறை பயன்பாட்டின் பின்னர், உணவுக்கொள்ளும் முன்னர் மற்றும் மூக்கை சீறுவது, இருமல் மற்றும் தும்பும் முன்னர் மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து.
- முகத்தை குறிப்பாக, வாய் அல்லது மூக்கை மற்றும் கண்களை கைகளை கழுவாமல் தொட வேண்டாம்.
- அடிக்கடி நடமாடும் பகுதிகளில் கைகளை தூய்மையாக்கும் சனிடைசர்களை வைக்கவும். அவை அடிக்கடி மீள நிரப்பப்படுவதை உறுதி செய்யவும்.
- கதவு பிடிிகள், மின் சவிட்ச்கள், கைப்பிடிிகள், கணனிகள், தொலைபேசிகள், கட்டிலுக்கு அருகிலுள்ள மேசைகள், குளியலறை சிங்க்கள், கழிவறைகள், விளையாட்டு பொருட்கள் மற்றும் அடிக்கடி தொடுகை ஏற்படுத்தப்படும் மேற்பரப்புகள் தொடர்பில் அவதானமாக இருக்கவும்.
- தும்மல் அல்லது இரும நேரிட்டால், உங்கள் மூக்கையும், வாயையும் டிஷு கொண்டு மூடிக் கொள்ளவும், பயன்படுத்திய பின்னர் அவற்றை முறையாக கழிவகற்றவும். டிஷு காணப்படாவிடின், உங்கள் முழங்கையை மடித்து அதனுள் தும்மவும் அல்லது இருமவும். கைகளை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கவும்.
- பணியிடத்தில் இருமல் அல்லது மூக்கினால் திரவம் வழியும் நிலையை எய்தினால் கடதாசி டிஷு மற்றும் அல்லது முகமூடிகளை பயன்படுத்துவதை உறுதி செய்யவும், பயன்படுத்திய பின்னர் அவற்றை மூடிய கழிவுத் தொட்டியினுள் இடவும். சுகயீனமுற்றால் பணிக்கு சமூகமளிக்க வேண்டாம்.
- குறைந்தளவு இருமல் அல்லது குறைந்தளவு காய்ச்சல் (37.3°ஊ அல்லது அதிகம்) கொண்டிருந்தால், வீட்டினுள் இருக்க வேண்டும். பரிசிடமோல் போன்ற அடிப்படை மருந்துகளை எடுக்க நேரிட்டாலும், அவர்கள் வீட்டில் இருக்க வேண்டும். இதனுடாக தொற்று ஏற்படுவதை தவிர்த்துக் கொள்ள முடியும்.
- அதிகளவு சனநெரிசலான, ஒன்றுகூடும் பகுதிகளை தவிர்த்துக் கொள்ளவும்.
- பதமடைவது மற்றும் உறுதி செய்யப்படாத போலித் தகவல்களை பரப்புவதை தவிர்த்துக் கொள்ளவும்.

ஆரம்ப அறிகுறிகள் - COVID-19 என்பது மூக்கிலிருந்து திரவம் வடிதல் அல்லது குளிர் காய்ச்சலுடன் கூடிய இருமலை ஏற்படுத்தாது என்பதுடன், வரண்ட மற்றும் காரமான இருமலை ஏற்படுத்தும்.